

ANTIGENNÍ TESTY MOHOU POMOCI ODHALIT NEMOC VČAS



TÉMA MĚSÍCE

Antigenní testy mohou pomoci odhalit nemoc včas

Možnost orientačního zjištění přítomnosti původců virových onemocnění v domácím prostředí pomocí volně prodejných antigenních testů

S přicházejícím obdobím respiračních onemocnění si stále více lidí uvědomuje důležitost případného včasného rozpoznání možné přítomnosti virového onemocnění. To přispívá k možnosti správné a včasné diagnostiky virové nemoci, která pak zpravidla vede k její rychlejší léčbě a také často umožní zabránit jejímu přenosu na další blízké osoby.

Právě pro pomoc při případném včasném rozpoznávání možné přítomnosti virového onemocnění jsou na trhu volně dostupné antigenní testy k domácímu použití. Ty umožňují získání orientačního výsledku ve velmi krátké době, a to zpravidla do 15 minut.

Volně prodejných antigenních testů je dostupných více druhů, například jde o níže popsané.

Antigenní testy SARS-CoV-2

Většině populace jsou z období pandemie dobře známé antigenní testy umožňující orientační zjištění možné přítomnosti původce [onemocnění Covid-19](#) označované jako testy SARS-CoV-2. Virus působící onemocnění Covid-19 se ovšem dosud má tendenci vracet, zejména na podzim v období respiračních onemocnění, **a proto se vám tyto testy i nadále mohou hodit.** [U testů na Covid-19](#) je možné si vybrat způsob odběru vzorku – jsou dostupné testy pracující se vzorkem získaným buď výtěrem z nosu, nebo odběrem ze slin, pomocí výtěru z úst.

Odběr vzorku ze slin je pro některé uživatele příjemnější než výtěrem z nosu. Při odběru vzorku ze slin je však třeba zabezpečit, aby před odběrem testovaná osoba alespoň 15 minut nejedla ani nepila.

Kombinované antigenní testy

V posledních dvou letech jsou dostupné také kombinované antigenní testy. Odběr vzorku u kombinovaných testů **probíhá zpravidla výtěrem z nosu**. Kombinované testy umí indikovat možnou přítomnost více virových onemocnění, zejména pak [chřipky](#) typu A nebo B. Zobrazení orientačního výsledku probíhá obvykle pro každou možnou virovou nákazu zvlášť, ale lze se setkat i se zobrazením pravděpodobné kombinované nákazy.

Antigenní testy zobrazí výsledek zpravidla **do 10 až 15 minut**. Při vyhodnocování výsledků je třeba postupovat přesně dle připojeného návodu k použití daného testu.

Kombinované antigenní testy si nacházejí své místo v domácích lékárnkách. Pravidelné testování kombinovanými antigenními testy totiž může napomoci minimalizovat riziko případného přenosu nákazy, a může proto být vhodné třeba před návštěvou seniorů, před vstupem do nemocnic a jiných zdravotnických zařízení, a to nejen v období častějšího výskytu virových respiračních onemocnění.

Kombinované testy v posledních letech hojně používají ve svých ordinacích také lékaři, a to i přesto, že jsou určeny i k domácímu použití – nejčastěji se s nimi takto můžete setkat v ordinaci praktického lékaře.

Podle [Antigenní testy mohou pomoci odhalit nemoc včas | BENU.cz](#) vybral Věroslav Kozák